Insecticides autorisés pour lutter contre les pucerons en été / céréales (1/2)

www.cadcoasbl.be

Classé par composition

Stade[1] : échelle phénol. BBCH : (**39**) Dernière feuille ; (**50-58**,**59**) Epiaison - fin d'épiaison ; (**60**) début floraison ; (**75-85**) grain laiteux - pâteux mou/ **DAR**[2] : délai avant récolte ;

* Echelle de sélectivité des insecticides vis-à-vis des principaux parasites et prédateurs de pucerons (Info CRA-W) : **1 = le plus sélectif** à 5 = le moins sélectif. DM = donnée manquante.

Zone tampon/Dérive[3] : Zone tampon en mètre et si précisé, avec technique réduisant la dérive en %

Produit avec date de fin d'utilisation. A cette date le produit devient un produit phytopharmaceutique non utilisable (PPNU).

Cadco asbl mise à jour **24/08/2018** Composition	* Sélectivité envers (entomofaune utile)	Nom commercial	Formulation	numéro d'autorisation	dose	nombre d'application	stade[1]	DAR[2] (Jour)	avoine	épeautre	froment de printemps	froment d'hiver	orge	seigle	triticale	zone tampon / dérive[3]
1. Pyréthrinoïdes	* Plus le chiffre est petit meilleur est la sélectivité					par cycle ou an			si autorisé, le nombre d'application maximum est précisé							
alpha-cypermethrine 50 g/l	4	FASTAC	EC	8958P/B	200 ml/ha	max. 2	50-59	-	max. 1							20 m / 90 %
beta-cyfluthrine 25 g/l	4	BULLDOCK 25 EC	EC	9835P/B	300 ml/ha	-	50-59	56	max. 1	-	max. 1					5 à 6 m
cypermethrine 100 g/l	3	CYTOX	EC	8653P/B	200 ml/ha	max. 2	50-59	-	max. 1							10 m
cypermethrine 200 g/l	3	CYPERSTAR	EC	9727P/B	100 ml/ha	max. 2	50-59	-	max. 1							1 à 6 m
		SHERPA 200 EC	EC	8968P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							
cypermethrine 500 g/l	3	CYPELCO	EC	1198P/P	40 ml/ha	max. 2	50-59	-	max. 1							20 m
		CYPERB	EC	10357P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							
		CYTHRIN MAX	EC	10106P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							
		INSECTINE 500 EC	EC	1176P/P		max. 2	50-59	-	max. 1							
		INTER CYPER 500	EC	1227P/P		max. 2	50-59	-	max. 1							
deltamethrine 15 g/l	DM	DECIS 15 EW	EW	10646P/B	420 ml/ha	max. 2	51-59	-	max. 1							5 à 6 m
		PATRIOT PROTECH	EW	10717P/B		max. 2	51-59	-	max. 1							
		SPLIT	EW	10718P/B		max. 2	51-59	-	max. 1							
deltamethrine 25 g/l	5	DECIS EC 2,5	EC	7172P/B	200 ml/ha	max. 2	50-59	-	max. 1							5 à 6 m
		DELTAPHAR	EC	10354P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							
		MEZENE (anc. SCATTO)	EC	10367P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							
		PATRIOT	EC	9207P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							
		POLECI	EC	10304P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							20 m
		SPLENDID, SPLENDOUR	EC	9627P/B, 10466P/B		max. 2	50-59	-	max. 1							5 à 6 m
		WOPRO-DELTAMETHRIN 2,5 EC	EC	1179P/P		max. 2	50-59	-	max. 1							
esfenvalerate 25 g/l	2	SUMI ALPHA *(31-03-2019)*	EC	8241P/B, *1041P/P*		max. 1	50-59	-	max. 1							
gamma-cyhalothrin 60 g/l	DM	NEXIDE	CS	10110P/B	75 ml/ha	max. 2	30-59	-	max. 2				-	max. 2		20 m
lambda-cyhalothrine 100 g/l	2	AKAPULKO 100 CS	CS	1237P/P	50 ml/ha	max. 2	60-85	-	max. 1							5 à 6 m
		KARATE ZEON	CS	9231P/B, 1067P/P		max. 2	60-85	-	max. 1							
		KARIS 100 CS	CS	10028P/B, 1133P/P		max. 2	60-85	-	max. 1							
		KORADO 100 CS	CS	10377P/B		max. 2	60-85	-	max. 1							
		LAMBADA	CS	1174 P/P		max. 2	60-85	-	max. 1							
		LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN	CS	9987P/B		max. 2	60-85	-	max. 1							
		NINJA	CS	9571P/B		max. 2	60-85	-	max. 1							
		SPARVIERO	CS	10179P/B		max. 2	60-85	-	max. 1							
lambda-cyhalothrine 50 g/l	2	LAMBDA 50 EC	EC	9749P/B	100 ml/ha	max. 2	60-85	-	max. 1							
		RAVANE 50	EC	9647P/B		max. 2	60-85	-	max. 1							

Insecticides autorisés pour lutter contre les pucerons en été / céréales (2/2)

Cadco asbl mise à jour 24/01/2018 Composition	* Sélectivité envers (entomofaune utile)	Nom commercial	Formulation	numéro d'autorisation	dose	nombre d'application	stade[1] d'application	DAR[2] (Jour)	avoine	épeautre	froment de printemps	froment d'hiver	orge	seigle	triticale	zone tampon / dérive[3]
tau-fluvalinate 240 g/l	2 ou 3	EVURE	EW	10728P/B	150 ml/ha	-	> 59	42	-	-	max. 1		-	-	-	10 m
		MAVRIK		7535P/B												
zetacypermethrine 100 g/l	2	FURY 100 EW		8476P/B		max. 2	50-59	28	max. 1							20 m
		MINUET (anc. SATEL)		9636P/B												
2. Carbamate																
pirimicarbe 50 %	2	PIRIMOR	WG	6640P/B, 1031P/P	250 g/ha	-	-	7	max. 2							1 à 6 m
3. Pyridine carboximate																
flonicamide 50 %	1	TEPPEKI	WG	9526P/B	160 g/ha	-	39-75	28	-	-	-	max. 2	-	-	-	1 à 6 m
flonicamide 50 %	1	FLONICABEL		1109P/P												
4. Pyréthrinoïde + Carbamate																
lambda-cyhalothrine 5 g/l pirimicarbe 100 g/l	3	OKAPI	EC	7978P/B	750 ml/ha	max. 1	> 58	7	-	-	max. 1		-	-	-	5 à 6 m
5. Organophosphorés																
dimethoate 400 g/l	DM	PERFEKTHION 400 EC	EC	9553P/B	500 ml/ha	max. 1	30-69	-	-	max.1			-	max.1		1 à 6 m / 90 %
		DANADIM PROGRESS		8720P/B												
		DIMISTAR PROGRESS		9528P/B												
		DIMISTAR PROGRESS 400 EC		8165P/B												
		PERFEKTHION TOP		10649P/B												
		ROGOR 40		6180P/B												